



Situación epidemiológica relevante

(Período del 13 al 19 de marzo, 2005)

Enfermedades inmunoprevenibles


En la semana se notificó 1 caso sospechoso de Sarampión/ Rubéola, en La Paz; por lo que se acumulan 32 en el año. No se ha confirmado ningún caso de estas enfermedades hasta el momento. También en la semana se reportaron dos casos de PFA en Santa Cruz y Chuquisaca, lo que hace un acumulado nacional de 14 casos. La notificación negativa para este evento en el periodo fue de 77.1%.

En el mismo periodo se reportaron 5 nuevos casos sospechosos de Fiebre amarilla: cuatro en Cochabamba y uno en La Paz. Se acumulan 26 casos hasta el momento, la mayoría en Cochabamba (18). Hasta la fecha se han confirmado 6 casos: en Cochabamba (5) y Santa Cruz. Se mantiene un incremento de la notificación de casos sospechosos de F. Amarilla en el país, las últimas dos semanas.

Dengue

Se observa una disminución semanal de casos de Dengue (ver figura), pues se notificaron en la semana 128 casos sospechosos, principalmente en Pando (43) y Beni (59). Sin embargo se ha incrementado el reporte en Santa Cruz que en la semana notificó 12 casos y 8 casos en el norte de La Paz. El acumulado nacional hasta el 19 de marzo es de 2855 casos (30 x 10⁵ hab.).

Casos sospechosos de Dengue por semana epidemiológica Bolivia, 2004-2005




El mayor acumulando de casos se mantiene en el Beni con 1689 casos (61% de la notificación acumulada), seguido por Pando (25%). Este último departamento presenta el mayor riesgo acumulado (1049 x 10⁵ hab.) y Beni el segundo riesgo mas alto (429 x 10⁵ hab.).

Por municipios, los mayores riesgos se registran en Cobija (2190 x 10⁵ hab.), Riberalta (1877 x 10⁵ hab.), Guayaramerín (264 x 10⁵ hab.) San Buenaventura (472 x 10⁵ hab.), Palos Blancos (317 x 10⁵ hab.), Ixiamas (287 x 10⁵ hab.) y Guanay (267 x 10⁵ hab.).

Hasta la fecha se han confirmado tres casos de Dengue hemorrágico en Cobija, Pando. No se han producido fallecimientos por esta enfermedad.

Acumulado de casos sospechosos de Dengue por departamento Bolivia, 2004-2005




| | CHQ | LPZ | CBBA | ORU | POT | TAR | SCZ | BEN | PAN |
|--------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| ■ 2004 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 222 | 277 | 494 | 38 |
| □ 2005 | 0 | 249 | 50 | 1 | 0 | 6 | 101 | 1748 | 700 |

Rabia

No se reportó ningún caso de rabia humana en la semana, se mantienen confirmados tres casos, en Tarija, Cochabamba y Beni (uno cada uno).

En la semana se reportaron 25 casos de rabia en animales, 12 en Cochabamba y 5 en Chuquisaca; la mayoría en perros. Se acumulan 211 animales rabiosos, 157 casos más que en el 2004.

Casos semanales de rabia animal Bolivia, 2003-2005



Durante la semana se notificaron 401 personas mordidas por animales sospechosos de rabia, la mayor cantidad se reportó en Cochabamba (125 lesionados), La Paz (72) y Santa Cruz (61). El acumulado asciende a 2809 personas lesionadas (30 lesionados x 10⁵ hab.). La mayor proporción se registra en Cochabamba (28%), La Paz (21%) y Tarija (18%). El riesgo más alto de lesión corresponde a Tarija (112 x 10⁵ hab.), seguido por Oruro (73 x 10⁵ hab.) y Chuquisaca (66 x 10⁵ hab.).

Malaria

Esta semana se reportaron 925 casos sospechosos de Malaria, la mayoría de ellos en Beni (593). Se acumulan 8160 casos en el año (87×10^5 hab.), el 65% de los casos se registra en el Beni. Este departamento y Pando mantienen el mayor riesgo de malaria en el país (1302 y 760 casos $\times 10^5$ hab. respectivamente).

Enfermedades diarreicas

El número de atenciones por EDA en la semana fue de 10951 episodios, 2095 atenciones fueron en Chuquisaca; lo que lleva el acumulado nacional a 9427219 atenciones (1151×10^5 hab.) principalmente en menores de 5 años. Las atenciones ofrecidas significan un 38% menos que hasta la misma semana del 2004. Del acumulado del año, el 20% de las atenciones se registran en Santa Cruz, pero los riesgos más altos mantienen en Pando (2994×10^5 hab.) y Chuquisaca (2786×10^5 hab.).

IRA y neumonía

En la semana se reportó la atención de 24954 episodios de IRA sin neumonía, en todas las edades. Santa Cruz continúa notificando la mayor cantidad de casos (6452 atenciones). En el año se acumulan 220845 episodios (2342×10^5 hab.), un 41% menos que el 2004. El 28% de los casos acumulados corresponden a Santa Cruz, pero el mayor riesgo de atenciones se observa en Chuquisaca (4701×10^5 hab.) y Pando (3906×10^5 hab.).

En la semana se notificaron 2150 casos de neumonía, para un acumulado anual de 19916 casos (211×10^5 hab.), un 48% menos que lo registrado el mismo periodo

de 2004. Un tercio de los casos se registra en Santa Cruz, pero el riesgo más alto se mantiene en Pando (697×10^5 hab.).

Otras enfermedades

Se mantienen reportados de 3 casos de Meningitis meningocócica, todos en Santa Cruz. Se han reportado 3 casos sospechosos de Hantavirus, pero solo se ha confirmado uno en Bermejo, Tarija. No se han reportado casos de Fiebre Hemorrágica Boliviana (FHB) hasta la fecha.

Información epidemiológica internacional

Brote de Gastroenteritis por Vibrio parahaemolyticus.


Chile, Enero – Marzo 2005

Desde el 4 de enero de 2005 comienzan a aparecer en la X región casos de gastroenteritis compatibles con un cuadro de intoxicación por Vibrio parahaemolyticus, extendiéndose a la V región los primeros días de febrero. Posteriormente, aparecen casos en todas las regiones, con excepción de las regiones II y III. El total acumulado al 27 de marzo asciende a 10.761 casos, de los cuales 839 han sido confirmados por laboratorio y el resto por nexo epidemiológico. De acuerdo al análisis de la encuesta realizada en la X región el 12 de febrero, el cuadro clínico se caracteriza por dolor abdominal, diarrea, vómitos y fiebre. Un 3% requirió hospitalización. Se observa una clara tendencia al descenso desde el 21 de febrero en adelante, con leves repuntes durante los fines de semana, destacándose el repunte observado el reciente fin de semana santa.

La principal medida de prevención es consumir los productos del mar bien cocidos y mantener una adecuada higiene en la preparación de éstos. Las acciones desarrolladas consisten en un amplio llamado a la población a NO consumir mariscos crudos mediante campaña de difusión radial y distribución masiva de volantes con las medidas de prevención. Refuerzo de la vigilancia epidemiológica y de laboratorio con alerta a los equipos de salud para detectar y notificar en tiempo real los casos de gastroenteritis por Vibrio parahaemolyticus ocurridos en todo el país y un refuerzo de las actividades de vigilancia y control ambiental.

Fte: <http://epi.minsal.cl/epi/html/Actualidad/vibrio/Boletinvibriion2005.htm>

Variación porcentual de la notificación de enfermedades seleccionadas. Bolivia, 2004/2005



Fuente: SNIS (hasta la semana 11)

Las barras a la derecha significa un incremento porcentual y hacia la izquierda una disminución del problema.

Notificación de enfermedades seleccionadas. Bolivia, 2004-2005 (casos sospechosos acumulados hasta el 19 de marzo)

| Enfermedades | 2004 | 2005 | Tasa/04 | Tasa/05 | Dif. 04-05 | % variación |
|---------------------|--------|--------|---------|---------|------------|-------------|
| EDA | 171163 | 108532 | 1855,1 | 1151,3 | -703,9 | -37,9 |
| IRA | 366420 | 220845 | 3971,4 | 2342,6 | -1628,8 | -41,0 |
| Malaria | 12037 | 8160 | 130,5 | 86,6 | -43,9 | -33,7 |
| Dengue | 1096 | 2855 | 11,9 | 30,3 | 18,41 | 154,9 |
| Neumonía | 37357 | 19916 | 404,9 | 211,3 | -193,6 | -47,8 |
| Rabia animal | 40 | 205 | 2,5 | 12,0 | 9,5 | 385,4 |
| Mordidos por animal | 3083 | 2809 | 33,4 | 29,8 | -3,6 | -10,8 |
| Hantavirus | 4 | 3 | 0,0 | 0,0 | -0,01 | -26,6 |
| Sarampión/ Rubéola | 28 | 32 | 0,3 | 0,3 | 0,04 | 11,9 |
| F. Amarilla | 5 | 26 | 0,1 | 0,3 | 0,22 | 408,9 |
| M. meningocócica | 2 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,01 | 46,8 |
| Tos ferina | 15 | 5 | 0,2 | 0,1 | -0,11 | -67,4 |
| PFA | 7 | 14 | 0,1 | 0,1 | 0,07 | 95,7 |
| Cólera | 5 | 1 | 0,1 | 0,0 | -0,04 | -80,4 |
| FHB | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | - |

Fuente: SNIS

Tasa $\times 1\ 000\ 000$ hab.

Semana epidemiológica No. 11

Cobertura de información rápida semanal

| | LPZ | CBBA | SCZ | CHQ | TAR | POT | ORU | BEN | PAN |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| % | 79.0 | 96.1 | 77.5 | 89.0 | 75.3 | 69.0 | 88.1 | 46.2 | 78.8 |

Sistema Nacional de Información en Salud: www.sns.gov.bo

Pasaje Capitán Ravelo No. 2161. La Paz, Bolivia
Teléfono: 2440336 Tel/Fax 2440590

Dirección:

Dr. Héctor Pérez Vargas

Coordinación:

Dr. Mario Lagrava

Elaborado por:

Dr. Ricardo Batista Moliner

Comité de redacción:

Dra. María Teresa Siles

Dr. Alejandro Sánchez B.

Dra. Narda Navarro

Dra. Jeannette Aguirre